



Cánula orofaríngea. Más conocida como cánula de Mayo. Se recomienda un set de cánulas de tamaños distintos.



Sistema de entrega de oxígeno: Está compuesto por una válvula de demanda con presión positiva de oxígeno, máscara de cara completa que permite entregar oxígeno al 21% (aire ambiental) o aire enriquecido en oxígeno desde un cilindro de oxígeno unido a ésta.



Fórceps de intubación Magill: Permite retirar pequeños objetos desde la faringe y cavidad bucal.



Jeringas: dos ó tres jeringas desechables plásticas de 2ml. con agujas adjuntas de diámetro 18 ó 20 G.




Laringoscopio



Epinefrina 1:1.000. Se recomienda tener una jeringa precargada con dos dosis de epinefrina a una concentración de 1:1.000, equivalentes a 0.3 mg/dosis o a 0.3 ml/dosis.



Puntas aspiradoras o eyector de alto volumen.



Kit para cricotiroidotomía



Broncodilatador: Salbutamol inhalador, con un dosificador que proporciona 100 mcg/puff.



Máscara de RCP de bolsillo, para entregar ventilación asistida.



Hiperglicemiante: Los recomendados son el jugo de naranjas o cualquier bebida cola no dietética. O simplemente agua azucarada.



Bolsa manual autoinflante o bolsa de ventilación manual. La marca más conocida es AMBU®.



Tabla para RCP



Esfingomanómetro. (Instrumento para medir la presión arterial)



Cilindro de oxígeno.



Bolsa o cartucho de papel. Permite que el paciente respire su aire exalado, elevando los niveles plasmáticos de CO₂ y disminuyendo los de O₂